



# 適正な水管理で分けつを確保！

## ◆ 田植え後の水管理

田植作業が始まっておりますが、天候が不安定で活着の遅れが心配されます。移植直後は深水管理をし温効果を高め早期活着に努めてください。その後の管理としては、早期の茎数確保のため、3～4cmの浅水管理により、分けつの発生を促してください。入水は温度較差をつけるため、出来るだけ早朝に短時間で行うようにお願いします。

また、気温の上昇とともに表層剥離や藻類の発生およびガス湧きが懸念されます。表層剥離や藻類の発生量が多いと地温の低下や除草剤効果の抑制等に結びつき、ガス湧きは根を傷める原因となりますので、水の入れ替えで環境の改善を図って下さい。

生育ステージ	時期	葉令	水管理	技術対応
分けつ期	5月下旬～6月中旬	5.1～8.5葉期	浅水管理	活着後は分けつ促進のための浅水管理
有効茎決定期	6月下旬	8.5～9.0葉期	深水管理	2次分けつ抑制のための深水管理
最高分けつ期	7月上旬	10葉期	中干し	生育量に基づいての中干し

### ★薬剤散布による表層剥離・藻類対策・・・モゲトン粒剤(1kg・3kg)

表層剥離: 10アールあたり1～2kg散布

アオミドロ: 10アールあたり2～3kg散布

できるだけ早めに薬剤散布してください。

## 統一草刈り期間（6月1日～6月14日）

毎年行っておりますが、6月1日から6月14日まで統一草刈り期間となっておりますので、カメムシの増殖を低下させるため、地域ぐるみの草刈り作業と刈り草の撤去を行って下さい。

また、近年発生量が多いアカスジカスミカメは、水田内のイネ科雑草(ヒエ類)やカヤツリグサ科(ホタルイシズイなど)の穂に産卵するので、水田内の除草対策も徹底して下さい。

## ◆余り苗について(いもち防除) 余り苗は早期に撤去！！

毎年、余り苗が見られる圃場があります。  
補植が終了したら土壤に埋没させるか



## ◆ 残草への中後期除草剤（ヒエ剤）

除草剤名	使用時期(移植栽培)	10a当り 使用量	使用 方法	使用 回数	成分 数	適用雑草等
クリンチャー 1 <sup>キ</sup> 粒剤	移植後7日～ ノビエ4.0葉期まで	1kg	湛水散布	2	1	ノビエ(4.0葉期)
	移植後25日～ ノビエ5.0葉期まで	1.5kg	湛水散布	2	1	ノビエ(5.0葉期)
クリンチャーEW	移植後20日～ ノビエ6.0葉期まで	100mℓ (水25～100ℓ)	湛水又は落 水散布	2	1	ノビエ(6.0葉期)
ヒエクリーン 1 <sup>キ</sup> 粒剤	移植後15日～ ノビエ4.0葉期まで	1kg	湛水散布	1	1	ノビエ(4.0葉期)
ヒエクッパ 1 <sup>キ</sup> 粒剤	移植後7日～ ノビエ4.0葉期まで	1kg	湛水散布	2	1	ノビエ(4.0葉期)
	移植後14日～ ノビエ5.0葉期まで	1.5kg	湛水散布	2	1	ノビエ(5.0葉期)

## ◆ 残草への中後期除草剤（ヒエ剤＋広葉剤）

アトリ 1 <sup>キ</sup> 粒剤	移植後15日～ ノビエ5.0葉期まで (稲4.0葉期以降)	1kg	湛水散布	1	1	ノビエ(4.0葉期) オモダカ、 クログワイ、コウキヤガラ、シズイ
フォローアップ 1 <sup>キ</sup> 粒剤	移植後15日～ ノビエ5.0葉期まで (稲4.0葉期以降)	1kg	湛水散布	1	2	ノビエ(5.0葉期) マツハイ、 ホタルイ、ミスカヤツリ、ウリカワ、ヘ ラオモダカ、オモダカ、クログワイ
ワイドアタックSC	移植後20日～ ノビエ5.0葉期まで (稲5葉期以降)	100mℓ (水100ℓ)	落水散布	2	1	ノビエ(5.0葉期) マツハイ、ホタルイ、ミスカヤツリ、ウ リカワ、ヘラオモダカ、クログワイ、 シズイ、オモダカ
ワイドパワー粒剤	移植後20日～ ノビエ5.0葉期まで (稲4葉期以降)	3kg	落水散布又 はごく浅い 湛水散布	1	2	ノビエ(5.0葉期) マツハイ、ホタルイ、ミスカヤツリ、ウ リカワ、ヘラオモダカ、クログワイ、 シズイ、オモダカ
クリンチャーバス ME液剤	移植後15日～ ノビエ5.0葉期まで	1000mℓ (水70～100ℓ)	落水茎葉 散布	2	2	ノビエ(5.0葉期) マツハイ、 ホタルイ、ミスカヤツリ、ウリカワ、ヘ ラオモダカ、オモダカ、クログワイ、 コウキヤガラ、シズイ
ヒエクリーン バサグラン粒剤	移植後15日～ ノビエ4.0葉期まで	3kg	ごく浅い 湛水散布	1	2	ノビエ(4.0葉期) マツハイ、ホタルイ、ミスカヤツリ、ウ リカワ、ヘラオモダカ、オモダカ、ク ログワイ、シズイ
ノミニー液剤	移植後30日～ クサネム40cm イボクサ30cmまで	50～100mℓ (水100ℓ)	落水散布又 はごく浅い 湛水散布	1	1	クサネム、イボクサ

## ◆ 残草への中後期除草剤（広葉剤）

バサグラン粒剤	移植後15日～55日	3～4kg	落水散布又 はごく浅い 湛水散布	1	1	マツハイ、ホタルイ、ミスカヤツリ、ウ リカワ、ヘラオモダカ、クログワイ、オ モダカ、シズイ
バサグラン液剤	移植後15日～55日	500～700mℓ (水70～100ℓ)	落水散布又 はごく浅い 湛水散布	2	1	マツハイ、ホタルイ、ミスカヤツリ、ウ リカワ、ヘラオモダカ、クログワイ、オ モダカ、シズイ