



農薬(除草剤)の飛散(ドリフト)防止について

農道・畦畔等で除草剤(非選択性除草剤)を散布する場合は、周辺圃場(水稻・野菜)へ飛散しないように注意が必要です。

周辺圃場へ作物がある場合は除草剤散布をひかえ、刈払い機で作業を行うようにしましょう。

散布が必要な場合は、風の無い日を選び、飛散防止カバーを付けて飛散しないように注意し散布するようにして下さい。

生育状況について

移植後は全体的に好天に恵まれ、活着は良好でした。ただし、昨年ほどではありませんが、土わき・表層剥離が発生している圃場が見られます。ひどい圃場では、根ぐされ症状がおきている圃場もありましたので水の入れ替え等を行い、稲の健全化に努めて下さい。圃場環境を悪いままにしておくことと分げつの発生に影響がでますので、対応をお願いします。

また、6月上旬の低温少照の影響により、水稻の生育は全般的に停滞し茎数不足の状況です。今後は、浅水管理で分げつの発生を促進し、目標茎数を早期に確保するよう努めて下さい。

病害虫の発生予報と防除対策について

～6月予報～

◆ 葉いもち病

秋田県病害虫防除所発行の発生予察情報(6月予報)によると、葉いもち病の発生量は平年並みとなっております。圃場内に余り苗を放置していると、発生源になりますので直ちに除去して下さい。

箱施用剤や側条施用剤を使用していない圃場については、オリゼメート剤の散布をお願いします。移植栽培では6月12日から18日頃、直播栽培では6月20日～25日頃に10aあたり2kgの散布をお願いします。

◆ イネヒメハモグリバエ

秋田県病害虫防除所発行の発生予察情報(6月予報)によると、発生量はやや少ないとなっておりますが一部地域では、第1世代による被害発生が確認されておりますので、6月に入ってから移植した圃場や直播圃場では、第2世代目による被害が発生する場合がありますのでご注意願います。

★トレボン粒剤・・・10アールあたり2～3kg(湛水散布)

◆ 斑点米カメムシ類

6月1日から14日まで、統一草刈り期間となっております。発生予察情報でもアカスジカメムシの発生は多いとなっておりますので、カメムシ繁殖地となる畦畔や休耕田等の草刈については必ず行うようにお願いします。又、圃場内にイネ科雑草(ヒエ類)やカヤツリグサ科(ホタルイ・シズイなど)の発生が確認されている圃場については、雑草対策もお願いいたします。

◆ 残草への中後期除草剤（ヒエ剤）

除草剤名	使用時期(移植栽培)	10a当り 使用量	使用 方法	使用 回数	成分 数	適用雑草等
クリンチャー 1 ^キ 粒剤	移植後7日～ ノビエ4.0葉期まで	1kg	湛水散布	2	1	ノビエ(4.0葉期)
	移植後25日～ ノビエ5.0葉期まで	1.5kg	湛水散布	2	1	ノビエ(5.0葉期)
クリンチャーEW	移植後20日～ ノビエ6.0葉期まで	100mℓ (水25～100ℓ)	湛水又は落 水散布	2	1	ノビエ(6.0葉期)
ヒエクリーン 1 ^キ 粒剤	移植後15日～ ノビエ4.0葉期まで	1kg	湛水散布	1	1	ノビエ(4.0葉期)
ヒエクッパ 1 ^キ 粒剤	移植後7日～ ノビエ4.0葉期まで	1kg	湛水散布	2	1	ノビエ(4.0葉期)
	移植後14日～ ノビエ5.0葉期まで	1.5kg	湛水散布	2	1	ノビエ(5.0葉期)

◆ 残草への中後期除草剤（ヒエ剤＋広葉剤）

フォローアップ 1 ^キ 粒剤	移植後15日～ ノビエ5.0葉期まで (稲4.0葉期以降)	1kg	湛水散布	1	2	ノビエ(5.0葉期) マツハイ、ホタル イ、ミスカヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、オ モダカ、クログワイ
アトトリ 1 ^キ 粒剤	移植後20日～ ノビエ4.0葉期まで (稲5.0葉期以降)	1kg	湛水散布	1	2	ノビエ(4.0葉期) ミスカヤツリ、ウリカ ワ、オモダカ、クログワイ、シズイ
ワイドアタックSC	移植後20日～ ノビエ5.0葉期まで (稲5葉期以降)	100mℓ (水100ℓ)	落水散布	2	1	ノビエ(5.0葉期) マツハイ、ホタルイ、ミスカヤツリ、ウリカワ、 ヘラオモダカ、クログワイ、シズイ、オモ ダカ
ワイドパワー粒剤	移植後20日～ ノビエ5.0葉期まで (稲4葉期以降)	3kg	落水散布又 はごく浅い 湛水散布	1	2	ノビエ(5.0葉期) マツハイ、ホタルイ、ミスカヤツリ、ウリカワ、 ヘラオモダカ、クログワイ、シズイ、オモ ダカ
クリンチャーバス ME液剤	移植後15日～ ノビエ5.0葉期まで	1000mℓ (水70～100ℓ)	落水茎葉 散布	2	2	ノビエ(5.0葉期) マツハイ、ホタル イ、ミスカヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、オ モダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ
ヒエクリーン バサグラン粒剤	移植後15日～ ノビエ4.0葉期まで	3kg	ごく浅い 湛水散布	1	2	ノビエ(4.0葉期) マツハイ、ホタルイ、ミスカヤツリ、ウリカワ、 ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズ イ
ノミニー液剤	移植後30日～ クサネム40cm イホクサ30cmまで	50～100mℓ (水100ℓ)	落水散布又 はごく浅い 湛水散布	1	1	クサネム、イホクサ

◆ 残草への中後期除草剤（広葉剤）

バサグラン粒剤	移植後15日～55日	3～4kg	落水散布又 はごく浅い 湛水散布	1	1	マツハイ、ホタルイ、ミスカヤツリ、ウリカワ、 ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、シズ イ
バサグラン液剤	移植後15日～55日	500～700mℓ (水70～100ℓ)	落水散布又 はごく浅い 湛水散布	2	1	マツハイ、ホタルイ、ミスカヤツリ、ウリカワ、 ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、シズ イ